

PRACE ORYGINALNE

CHARAKTERYSTYKA KOBIET Z PADACZKĄ W CIĄŻY.
PROSPEKTYWNE WIELOOŚRODKOWE BADANIE W POLSCE
W LATACH 2000-2001Beata Majkowska-Zwolińska¹, Joanna Jędrzejczak²,
Krzysztof Owczarek^{2, 3}, Jerzy Majkowski³¹Klinika Neurochirurgii Akademii Medycznej
ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa²Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa³Diagnostyczno-Terapeutyczne Centrum Padaczki, Fundacja Epileptologii
ul. Wiertnicza 122, 02-952 Warszawa**Streszczenie**

Wprowadzenie. Badania dotyczące kobiet z padaczką w ciąży skupiają się zwykle na ocenie wpływu leków przeciwpadaczkowych na przebieg ciąży i dobrostan płodu. Nie ma natomiast badań prowadzonych na dużym materiale charakteryzującym tę grupę kobiet.

Cel. Przedstawienie danych demograficznych i charakterystyki kobiet z padaczką w ciąży w odniesieniu do pozostałych kobiet z padaczką i populacji kobiet bez padaczki w wieku rozrodczym.

Materiał i metoda. Dane zebrano w ramach prospektywnego wielośrodkowego badania ankietowego przeprowadzonego w ciągu 12 miesięcy (2000/2001). Analizie poddano dane 1268 kobiet w wieku rozrodczym, tj. od 17. do 40. rż. Sześćdziesiąt spośród nich (4,7%) było w ciąży. Dane ich porównywano z danymi pozostałych kobiet z padaczką i danymi ogólnej populacji kobiet wg rocznika demograficznego.

Wyniki. W roku 2000 w Polsce odsetek urodzeń w ogólnej populacji wynosił 5,07%. Największy odsetek ciąży u kobiet z padaczką stwierdzono w grupach wiekowych od 19. do 22. rż. (31,6%) i między 31. a 32. rż. (26,7%). Ponad połowa kobiet z padaczką w ciąży pracowała w porównaniu z 29,1% pozostałych kobiet z padaczką, wśród kobiet z padaczką 26,8% ucyliło się, natomiast wśród kobiet w ciąży odsetek ten wyniósł jedynie 8,5% ($\chi^2 = 15,6$; $p < 0,0015$). Kobiety z padaczką w ciąży częściej miały wykształcenie wyższe i średnie (13,3% i 65%) w porównaniu z innymi kobietami z padaczką (7,8% i 51,8%). ($\chi^2 = 9,05$; $p < 0,025$). Natomiast, w populacji ogólnej wykształcenie wyższe ma 15,3% rodzących. Najczęściej u kobiet w ciąży występował jeden rodzaj napadów: częściowe złożone (38,1%), toniczno-kloniczne (48,8%) i częściowe proste (8,3%). Częstość napadów u kobiet w ciąży na tle innych badanych kobiet była porównywalna ($\chi^2 = 9,09$; $p = n.i.$). U kobiet w ciąży częściej stosowano monoterapię (73,3%) niż u innych kobiet z padaczką (53,8%) ($\chi^2 = 11,38$; $p = 0,003$) oraz częściej występowały u nich remisje (48,3% vs 33,9%) ($\chi^2 = 7,70$; $p < 0,007$). Rzadziej niż pozostałe kobiety z padaczką uskarżały się na inne choroby (11,7% vs 26,6%) ($\chi^2 = 7,70$; $p < 0,007$).

Wnioski. Kobiety z padaczką w ciąży były lepiej wykształcone niż pozostałe kobiety, częściej pracowały zawodowo pomimo porównywalnej częstości napadów. Częściej stosowały monoterapię i częściej występowały u nich remisje. Rzadziej też występowały u nich inne choroby.

Słowa kluczowe: Padaczka – Ciąża – Epidemiologia – Leczenie – Remisje